

Laboratoire FORESTIER	INSTRUCTION	Page : 1/1
	Conseils prise de sang à jeun	Référence document : MO-V-5.4-033 Version : 03

Prise de sang à jeun

Prise de sang à jeun : peut-on boire un verre d'eau, un café, un thé, une infusion ?

OUI, il est possible de boire de l'eau, du café ou du thé SANS sucre, SANS lait, SANS crème ...

Pour une prise de sang à jeun, aucun apport calorique sous forme solide (aliments) n'est autorisé !

« PRINCIPAUX EXAMENS A PRELEVER A JEUN »

- Acide Urique
- Calcitonine
- Calcium
- CLA (MAST CLA 30)
- Cross laps (CTX)
- Cryoglobulines
- Bilan lipidique (Cholestérol, Triglycérides, LDL, HDL, Apo A1, Apo B, Lp(a) et LpA1)
- Electrophorèse des protéines, immunofixation
- Fer /capacité totale fixation/ coefficient saturation
- Gastrine (jeun strict, ne rien absorber)
- Glycémie, Insuline
- Homocystéine
- Ostéocalcine
- Phosphore, taux réabsorption du phosphore
- Heli-kit (jeun strict, ne rien absorber, ne pas fumer).

Le test doit être réalisé après arrêt de tout traitement antibiotique depuis au moins 4 semaines, arrêt des antisécrotoires depuis 2 semaines (IPP, anti-H2), arrêt des pansements gastro-intestinaux depuis 24 heures.)